

Síndromes ITS: Tratamientos y Códigos

Columna	Síndrome	CIE-10	Tratamiento de Elección y Alternativo	Manejo de contacto sex	Responsable de Supervisión / Atención
1	Cervicitis	N72.X	Ceftriaxona 1 g (IM, dosis única) + Doxiciclina 100 mg (1 tab. VO c/12h por 7 días) o Ceftriaxona 1 g (IM, dosis única) + Azitromicina 500 mg (2 tab. VO, dosis única)	Contactos en los 60 días previos al inicio de síntomas, reciben tratamiento del síndrome de descarga uretral	Prof. Salud: Identificación de flujo mucopurulento o dolor a la movilización del cérvix.
2	Dolor Abdominal Bajo (EPI)	A64X5	Ceftriaxona 1 g (IM) + Doxiciclina 100 mg (VO c/12h por 14 d) + Metronidazol 500 mg (VO c/12h por 14 d) o Ceftriaxona 1 g (EV c/24h por 14 días) + Doxiciclina 100 mg (VO c/12h por 14 d) + Metronidazol 500 mg (EV 1 ampolla c/12h por 14 d)	Contactos en los 60 días previos al inicio de síntomas, reciben tratamiento del síndrome de descarga uretral	Médico: Evaluación de abdomen agudo, decisión de hospitalización y seguimiento a las 48-72h.
3	Síndrome de Descarga Rectal	A64X7	Ceftriaxona 1 g (IM, dosis única) + Doxiciclina 100 mg (1 tab. VO c/12h por 7 días)* o Ceftriaxona 1 g (IM, dosis única) + Azitromicina 500 mg (2 tab. VO, dosis única)	Contactos en los 60 días previos al inicio de síntomas	Profesional de la Salud: Evaluación de riesgo y manejo de contactos.
4	Síndrome de Descarga Uretral	A64X6	Ceftriaxona 1 g (IM, dosis única) + Doxiciclina 100 mg (1 tab. VO c/12h por 7 días) o Ceftriaxona 1 g (IM, dosis única) + Azitromicina 500 mg (2 tab. VO, dosis única)	Contactos en los 60 días previos al inicio de síntomas	Profesional de la Salud: Realización de examen físico y tamizaje con pruebas rápidas.
5	Síndrome de Flujo Vaginal Anormal	A64X9	Metronidazol 500 mg (4 tab. VO, dosis única) + Fluconazol 150 mg (1 tab. VO, dosis única) o Metronidazol 500 mg (1 tab. VO c/12h por 7 días) + Clotrimazol (óvulos/tab. 500 mg, dosis única en la noche)		Obstetrix / Prof. Salud: Examen especular y tacto bimanual para descartar cervicitis o EPI.
6	Síndrome de Úlcera Genital	A64X4	Bencilpenicilina Benzatínica 2.4 mill. UI (IM, dosis única) + Aciclovir 400 mg (2 tab. VO c/12h por 5 días) o Doxiciclina 100 mg (1 tab. VO c/12h por 14 días) + Aciclovir 400 mg (2 tab. VO c/12h por 5 días)	Contactos en los 90 días previos al inicio de síntomas	Profesional de la Salud: Diagnóstico sindrómico e inicio inmediato de tratamiento.
			*Ante persistencia de dolor muy intenso, descarga sanguinolenta y/o úlceras perianales tras 7 días de tratamiento, continuar doxiciclina 21 días y referir		